

Se organizarán mesas informativas en siete hospitales madrileños y en una calle céntrica, y conferencias a cargo de médicos especialistas, entre otras iniciativas

## En octubre se celebrará el Día Mundial del Ostomizado

- Se calcula que el 1'5 por mil de la población española convive con una ostomía, lo que supone en total un colectivo de unas 70.000 personas en España

### Madrid, 25 junio'9

El próximo 3 octubre se celebrará el Día Mundial del Ostomizado, un colectivo que solo en España agrupa a unas 70.000 personas. El objetivo es dar a conocer la problemática, necesidades y aspiraciones de este amplio colectivo que se incrementa cada año.

La Asociación de Ostomizados de Madrid (AOMA), integrada en la Federación Española de Asociaciones de Ostomizados (FEDAO), que engloba a varias asociaciones del resto de España, está organizando, de cara a la celebración del Día Mundial del Ostomizado, diversas actividades entre los días 28 de septiembre y 3 de octubre, que se materializarán en forma de mesas informativas en siete hospitales madrileños y en una calle céntrica, y de conferencias a cargo de médicos especialistas, entre otras iniciativas.

Una ostomía es un orificio de salida artificial, que practica un cirujano en la pared abdominal, debido a diversos diagnósticos, para facilitar la salida al exterior de los productos de desecho del organismo, teniendo que portar una bolsa permanentemente para la recogida de los mismos.

Aunque no existen datos estadísticos fiables a nivel nacional, es indudable que el impacto social de esta discapacidad es enorme, dado el volumen de población a la que afecta y los problemas en la vida diaria que deben afrontar los afectados.

Comparando algunas estadísticas, se llega a la conclusión de que el 1'5 por mil de la población española convive con una ostomía, lo que supone en total un colectivo de unas 70.000 personas. Por lo tanto, la incidencia de la ostomía correspondería a más de un 3 por mil de la población adulta española. En otros países occidentales se recogen cifras que oscilan entre el 2 y el 4 por mil de los adultos.